

แบบบันทึกการเฝ้าระวังการใช้ยา

Norepinephrine Inj. (4 mg/4 ml)

ชื่อ-สกุลผู้ป่วย

ข้อควรระวังในการบริหารยา

- เจือจางด้วย D5W หรือ D5S ห้ามผสม NSS
- ห้ามผสมหรือให้พร้อมยา Sodium bicarbonate
- ต้องป้องกันแสงขณะบริหารยาสารละลายที่เจือจางแล้วจะมีความคงตัว 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง โดยเก็บให้พ้นแสง

วันที่	เวลา	การติดตามการให้ยา					การติดตามอาการไม่พึงประสงค์				
		HR (>120 ครั้ง/นาที)	BP (160/100 mmHg)	ผิวซีดเย็น /เขียว	ตรวจ IV Site	ปวดศีรษะ	N/V	หายใจหอบ เหนื่อย	ปลายมือ ⁺ /เท้าเขียว	แน่นหน้าอก	
	ตีก										
	เช้า										
	บ่าย										
	ตีก										
	เช้า										
	บ่าย										
	ตีก										
	เช้า										
	บ่าย										
	ตีก										
	เช้า										
	บ่าย										
	ตีก										
	เช้า										
	บ่าย										
	ตีก										
	เช้า										
	บ่าย										

● การติดตามการให้ยา

หมายเหตุ : ทำเครื่องหมาย ✓ กรณีค่าสัญญาณซึ่งปกติ หากผิดปกติให้ลงค่า/อาการนั้น แล้ว วงกลม เพื่อรายงานแพทย์

: ค่าผิดปกติ ผู้ใหญ่ -> HR > 120 ครั้ง/นาที, BP -> 160/100 , เด็ก -> HR > 180 ครั้ง/นาที, BP -> 120/80

● การติดตามอาการไม่พึงประสงค์

หมายเหตุ : ทำเครื่องหมาย ✗ เมื่อไม่มีอาการ : ✓ กรณีมีอาการผิดปกติ แล้ว วงกลม เพื่อรายงานแพทย์ ; - หากผู้ป่วยสื่อสารไม่ได้