

มาตรการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยา

มาตรการป้องกันการจ่ายยาผิดชนิด

- ๑) ยา LASA ให้จัดวางห่างกัน
- ๒) ยาประเภท LASA ใช้ Tall man letter เพื่อระบุชื่อยาที่ฉลากยา
- ๓) ปรับปรุงป้ายชื่อยาที่ขึ้นวางยาให้เป็นชื่อเดียวกับที่ระบุที่ฉลากยา เพื่อป้องกันการสับสนเวลาจัดยา
- ๔) ในการพิมพ์ จัด และตรวจสอบยา ควรระวังให้ถี่ถ้วนมากกว่าปกติสำหรับยาปฏิชีวนะชนิดผงที่เป็น LASA เช่น Ampicillin, Cefazolin, Cloxacillin, Ceftriaxone, Ceftazidime เนื่องจากพบอุบัติเหตุการจ่ายยาผิดชนิดบ่อย
- ๕) ยาที่กลุ่มงานเภสัชกรรมผลิตเองที่มีภาชนะบรรจุเหมือนกัน เช่น ยาครีมแต่ละชนิด, ยาหยอดตาแต่ละชนิด, MCT oil กับ Posphate solution, Calamine กับ Hibi scrub ใช้ sticker สีที่แตกต่างกันเพื่อป้องกันความแตกต่างของยาแต่ละชนิด
- ๖) ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์กำกับคือ ชื่อที่ Sticker ยากับชื่อที่ขึ้นวางยาสำหรับยาตัวเดียวกัน ให้มีเลขสัญลักษณ์เป็นเลขเดียวกัน เพื่อให้ผู้จัดยาไม่สับสนกรณียาที่มีชื่อใกล้เคียงกัน เช่น ยาฉีดในกลุ่ม Cephalosporins (ชื่อนี้ร้อประสานกับ HOMC)

มาตรการป้องกันการจ่ายยา Warfarin ผิดความแรง

- ๑) ระบุสียาที่ฉลากยา Warfarin
- ๒) Warfarin ๕ mg ซึ่งเป็นความแรงที่ใช้บ่อยกว่า ๓ mg ให้นำเลขแสดงความแรงไว้หน้าชื่อยา
- ๓) เนื่องจาก Warfarin เป็นยาต้องใส่ซองสีขาเพื่อกันแสง การจัดยา Warfarin ผู้จัดไม่ต้องจัดยาใส่ซอง ให้ผู้จ่ายยาเป็นผู้ใส่ซองเพื่อความสะดวกในการตรวจซ้ำและลดการผิดพลาด
- ๔) ที่ขึ้นวางยามีย้ายออกมาเพื่อเตือนให้ผู้จัดยาระมัดระวังเพิ่มขึ้น

มาตรการป้องกันการจ่ายยาผิดวิธีใช้

- ๑) กรณีจ่ายยาผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ผู้จ่ายยาสอบถามวิธีใช้ยาผู้ป่วยทุกครั้ง

มาตรการป้องกันการจ่ายยาผิดคน

- ๑) ผู้จ่ายยาตรวจสอบชื่อในบัตรประชาชนของผู้ป่วยให้ตรงกับชื่อที่ Sticker ยาทุกครั้งก่อนจ่ายยา

มาตรการป้องกันการจ่ายยาผิดจำนวน

- ๑) กำหนดรายการยาที่จำเป็นต้อง Prepack เพื่อความสะดวกในการ Check จำนวน เช่น ยาโรคเรื้อรัง (เพราะหากได้รับยาไม่ครบ ผู้ป่วยอาจได้รับอันตราย)
- ๒) ยา HAD เช่น Warfarin ผู้ Check ยาจะต้องนับจำนวนเม็ดทุกครั้ง

มาตรการป้องกันการจ่ายยาหมดอายุ

- ๑) สุ่มตรวจวันหมดอายุยาบนชั้นวางยาทุกรายการ ทุก ๑ เดือน
- ๒) มีแผ่นกั้นระหว่างยาแต่ละ Lot (กรณียาที่ขึ้นวางยามีมากกว่า ๑ Lot)
- ๓) ยาที่ใกล้หมดอายุให้ผู้จัดใส่ป้ายเตือนวันหมดอายุไปกับยา เพื่อให้ผู้ตรวจและผู้จ่ายสังเกต และแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ

มาตรการป้องกันความคลาดเคลื่อนจากการจ่ายยากลุ่ม High alert drugs

- ๑) ให้ผู้จ่ายยาทบทวนวิธีใช้ยากับผู้ป่วยทุกครั้งที่ยา เช่น Warfarin, Insulin
- ๒) ใช้ซองยาที่แตกต่างจากยาปกติ (ซองใสคาดสีชมพู)
- ๓) การจัดยา HAD ผู้จัดยาไม่ต้องใส่ซอง ให้ผู้จ่ายเป็นผู้ใส่ซอง เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบซ้ำ